



Antibiothérapie intraveineuse : Méthodes de soins

SOMMAIRE

Surveillance du site du cathéter

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Positionner votre enfant
5. Surveiller le site du cathéter
6. Vérifier le pansement
7. Vérifier toutes les tubulures
8. Vérifier la longueur externe du cathéter, si pertinent
9. Récupérer

Irrigation du cathéter

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le matériel
5. Enlever les bulles d'air de la seringue de solution saline
6. Positionner votre enfant
7. Surveiller le site du cathéter
8. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter
9. Enlever le capuchon protecteur de la seringue de solution saline
10. Visser la seringue sur le connecteur sans aiguille du cathéter
11. Irriguer le cathéter avec la solution saline
12. Débrancher la seringue du connecteur sans aiguille du cathéter
13. Irriguer le cathéter avec la solution de verrouillage, si nécessaire
14. Surveiller le site du cathéter
15. Récupérer

Administration d'antibiotique intraveineux par pompe à perfusion élastomérique

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le perfuseur
5. Préparer le matériel
6. Positionner votre enfant
7. Surveiller le site du cathéter
8. Irriguer le cathéter avec la solution saline
9. Désinfecter le connecteur sans aiguille du cathéter
10. Brancher la tubulure du perfuseur au connecteur sans aiguille du cathéter
11. Administrer le médicament
12. Sécuriser le perfuseur
13. Vérifier la fin de la perfusion
14. Débrancher la tubulure du perfuseur du connecteur sans aiguille du cathéter
15. Irriguer le cathéter avec la solution saline
16. Irriguer le cathéter avec la solution de verrouillage, si nécessaire
17. Surveiller le site du cathéter
18. Récupérer

Administration d'antibiotique intraveineux par pompe à perfusion ambulatoire – Changement du sac ou de la cassette-réservoir

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le médicament
5. Préparer le matériel
6. Positionner votre enfant
7. Arrêter la pompe
8. Changer le sac, si pertinent
9. Enlever la cassette-réservoir vide, si pertinent
10. Installer la nouvelle cassette-réservoir, si pertinent
11. Surveiller le site du cathéter
12. Débrancher la tubulure de la pompe du connecteur sans aiguille
13. Irriguer le cathéter avec la solution saline, si nécessaire
14. Rebrancher la tubulure de la pompe au connecteur sans aiguille du cathéter
15. Remettre la pompe en fonction
16. Sécuriser le sac et la pompe
17. Récupérer

Administration d'antibiotique intraveineux par pompe à perfusion ambulatoire – Changement du sac ou de la cassette-réservoir ET de la tubulure

1. Anticiper
2. Se préparer
3. Procéder
4. Préparer le médicament
5. Préparer le matériel
6. Positionner votre enfant
7. Arrêter la pompe
8. Enlever la cassette ou la cassette-réservoir vide de la pompe
9. Installer le nouveau sac et la nouvelle tubulure de la cassette, si pertinent
10. Installer la nouvelle cassette-réservoir et la nouvelle tubulure de rallonge, si pertinent
11. Faire le vide d'air de la nouvelle tubulure
12. Débrancher l'ancienne tubulure du connecteur sans aiguille
13. Surveiller le site du cathéter
14. Irriguer le cathéter avec la solution saline, si nécessaire
15. Brancher la nouvelle tubulure au connecteur sans aiguille du cathéter
16. Remettre la pompe en fonction
17. Sécuriser le sac et la pompe
18. Récupérer