



www.soinscomplexesadomicilepourenfants.com
www.complexcareathomeforchildren.com



Ensemble pour soutenir les familles... un jour à la fois!

Together to support families... one day at a time!

NUTRITION PARENTÉRALE : FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DONNÉES CLINIQUES

Nom

Sommaire du diagnostic principal de l'enfant

Demande de service

Étant donné la lourdeur des soins décrite ci-dessous et les recommandations d'un comité d'experts représentant les quatre CHU du Québec à mission pédiatrique, (document disponible sur demande), nous recommandons _____ heures-soins par semaine pour le soutien de la famille à domicile.

Soins requis

Nutrition parentérale heures/jour, jours/semaine

Préparation et administration de médicaments

Nutrition entérale

Alimentation orale

Soins de stomie digestive

Autres soins

Nutrition parentérale (NP)

Surveillance directe de l'enfant en particulier, chez le jeune enfant afin de s'assurer qu'il ne tire pas sur son cathéter et de réduire le risque d'étranglement avec la tubulure du cathéter.

Soins du cathéter veineux central (CVC) : Le parent doit surveiller l'apparence du site du cathéter, vérifier que le pansement est propre et sec et vérifier que les tubulures ne sont pas pincées ou pliées avant, pendant (au minimum 2 fois) et après l'administration de la nutrition parentérale ou au moins 1 fois par jour, si le cathéter n'est pas utilisé.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée : <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/surveillance-du-site-du-catheter/>

Préparation et administration de la nutrition parentérale (NP) : La plupart du temps, la NP est débutée en soirée et administrée jusqu'au matin. La préparation du sac se fait avant le début de l'administration; elle comprend l'inspection du sac (est intact, ne coule pas et ne contient pas plus de bulles d'air qu'à l'habitude), l'ajout de vitamines ou d'autres additifs dans le sac, le mélange de la solution et le raccordement de la tubulure au sac. Le parent doit ensuite préparer la pompe pour l'administration; il doit vérifier si les paramètres programmés concordent avec la prescription, changer les paramètres de la pompe au besoin lorsque la NP est ajustée, installer la tubulure sur la pompe et faire le vide d'air. Avant de brancher la tubulure et de débuter la NP, le parent doit irriguer le CVC. La préparation du sac, le raccordement de la tubulure, la programmation de la pompe, l'action de vider l'air de la tubulure, l'irrigation du CVC et le branchement de la NP prend environ 45-60 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée : <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/preparation-du-sac-de-nutrition-parenterale-et-ajout-des-additifs/> et <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/irrigation-du-catheter/> et <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/administration-de-la-solution-de-nutrition-parenterale/>

Débranchement de la nutrition parentérale (NP) : Le débranchement se fait à la fin de l'administration de la solution. Le CVC doit être irrigué avant de le verrouiller avec la solution prescrite. Débrancher la NP, irriguer et verrouiller le CVC prend environ 5-15 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée : <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/administration-de-la-solution-de-nutrition-parenterale/> et <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/nutrition-parenterale/irrigation-du-catheter/>

Répondre au besoin de l'enfant durant la nuit en lien avec la nutrition parentérale (NP) : Le parent doit vérifier la pompe de NP pour s'assurer du bon fonctionnement, vérifier que le sac de nutrition parentérale se vide progressivement, vérifier que le site et le pansement du CVC est intact, au minimum 2 fois/nuit en plus de répondre aux alarmes de la pompe. En cas d'alarme, le parent doit identifier la cause de l'alarme et résoudre le problème.

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d'évaluer et poser certaines actions pour résoudre les problèmes qui peuvent être rencontrés.

Préparation et administration de médicaments

Médicaments par voie orale ou tube d'alimentation : Le temps de préparation des médicaments varie selon le nombre requis et la nature de la préparation nécessaire. En moyenne, le parent doit préparer 4 à 6 médicaments différents/jour. La préparation prend environ 30 minutes/jour.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Nombre de médicaments :
- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 personne

Le temps d'administration varie selon l'âge et la capacité de l'enfant à collaborer à ses soins. Si les médicaments sont administrés par tube d'alimentation, le parent doit les donner séparément et irriguer le tube d'alimentation avant et après l'administration de

chaque médicament. Le temps variera selon le nombre de médicaments à administrer. En moyenne, l'administration des médicaments par tube d'alimentation prend environ 5 à 10 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Nombre de médicaments :
- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée :

Médicaments intraveineux : Les médicaments intraveineux sont, dans la plupart des cas, déjà préparés par la pharmacie. Pour donner le médicament, le parent doit irriguer le CVC, brancher le médicament et débiter la perfusion. Une fois le médicament administré, le parent doit débrancher le médicament, irriguer et verrouiller le CVC avec la solution prescrite. Le branchement/débranchement du médicament intraveineux prend, en moyenne, 10 à 30 minutes. Le temps de la perfusion varie selon le médicament à donner et le volume d'administration.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Nombre de médicaments :
- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée :

Nutrition entérale

Surveillance de l'enfant : Le parent doit s'assurer en tout temps que l'enfant (en particulier chez les plus jeunes et ceux ayant une déficience neurologique) ne tire pas sur le tube d'alimentation. Pendant qu'il reçoit un gavage, il doit être sous surveillance directe.

Soins du tube d'alimentation : L'intégrité de la peau autour du tube d'alimentation doit être examinée quotidiennement. La peau doit être propre, sèche et non-irritée. Elle doit être nettoyée, en moyenne, 1 à 2 fois par jour et au besoin. Afin de garder la peau sèche, une compresse est souvent installée autour du tube d'alimentation; celle-ci doit être changée lorsqu'elle est souillée. Si

l'enfant a un tube nasal, le parent doit s'assurer que le pansement qui sécurise le tube en place est intact et le changer au besoin.

Les soins de la peau prennent, en moyenne, 5 à 15 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Type de tube d'alimentation :
- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 personne (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée :

L'emplacement du tube d'alimentation doit être vérifié après son installation, avant son utilisation et au besoin.

Le tube d'alimentation doit être irrigué au minimum deux fois par jour si non utilisé, avant et après l'administration de solution de gavages; avant et après l'administration de chaque médicament ainsi qu'aux 4 heures durant un gavage en continu.

Pour utiliser le bouton d'alimentation, le parent doit raccorder une rallonge. Si le bouton est muni d'un ballonnet, le volume d'eau à l'intérieur doit être vérifié 1 fois/semaine, avec l'accord de l'équipe de soins, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite d'eau et que le ballonnet fonctionne bien.

Préparation de la solution de gavage : Il existe plusieurs types de formules. Certaines sont prêtes à l'emploi tandis que d'autres demandent une préparation. Certains enfants reçoivent des formules spéciales qui requièrent une préparation en plus d'ajout d'additifs et de médicaments, ce qui augmente la complexité de la manœuvre et le temps de préparation pour le parent. En moyenne, la préparation de la solution de gavage prend environ 20-30 minutes/jour.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour pour faire le soin :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 personne

Administration du gavage : Le gavage peut être administré en continu, de façon intermittente ou en combinaison intermittent/en continu, en utilisant la méthode par seringue, par gravité ou par pompe. Le temps de préparation pour administrer le gavage varie en fonction de la méthode utilisée. Le tube d'alimentation doit être irrigué avant et après l'administration de la solution de gavage et aux 4 heures durant un gavage en continu. La plupart du temps, les gavages sont administrés de façon intermittente le jour sur un période de 60 minutes et en continu la nuit.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 personne (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée :

Répondre au besoin de l'enfant durant la nuit : Si l'enfant reçoit un gavage en continu durant la nuit, le parent doit se lever pour remplir le sac de gavage aux 4 heures et irriguer le tube d'alimentation aux 4 heures en plus de répondre aux alarmes de la pompe; en cas d'alarme, il doit identifier la cause et résoudre le problème.

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d'évaluer et poser certains gestes pour résoudre les problèmes rencontrés.

Alimentation orale

Stimulation orale : La plupart des enfants peuvent s'alimenter par la bouche mais ils ont besoin de beaucoup de stimulation car les repas sont souvent deux fois plus longs que chez les enfants en santé. En effet, ces enfants peuvent déjà avoir des problèmes à accepter/mettre quelque chose dans leur bouche et/ou peuvent avoir des difficultés avec la fonction motrice de la bouche.

Temps par repas : en moyenne, entre 30 à 45 minutes /repas; 10 à 15 minutes /collation.

De plus, les enfants ont souvent un plan de stimulation orale individualisé et des exercices à faire durant la journée (ergothérapeute; nutritionniste).

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

Stomie digestive

Surveillance de l'enfant : Le parent doit s'assurer en tout temps que l'enfant (en particulier chez les plus jeunes et ceux ayant une déficience neurologique) ne touche pas au sac ni ne tente de l'enlever.

Changement de l'appareil collecteur : L'appareil collecteur est changé régulièrement aux 3 à 7 jours et au besoin. Le changement comprend les soins de la peau au pourtour de la stomie, la découpe de l'ouverture de la barrière cutanée du nouvel appareil collecteur (si besoin) et l'installation de l'appareil collecteur. Le changement de l'appareil collecteur prend environ 20 à 30 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée : <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/stomies-digestives/changement-de-lappareil-collecteur/>

Vidage du sac de l'appareil collecteur : Le sac collecteur doit être vidé régulièrement pour éviter les débordements et les fuites de selles causées par le décollement de la collerette. La vidange prend environ 2 à 5 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin :
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 à 2 personnes (une deuxième personne peut être nécessaire si l'enfant est jeune et/ou bouge)
- Méthode de soins recommandée : <https://soinscomplexesadomicilepourenfants.com/stomies-digestives/vidange-du-sac-de-lappareil-collecteur/>

Résolution des problèmes : Les parents ont reçu la formation afin d'évaluer et poser certains gestes pour résoudre les problèmes rencontrés.

Autres

Changement des couches, de la literie et des vêtements : Le parent doit se lever plusieurs fois par nuit pour répondre aux besoins de l'enfant, le plus souvent à cause de diarrhées abondantes. Le changement des vêtements et de la literie est souvent nécessaire et peut prendre entre 5 à 25 minutes.

Selon la condition de l'enfant pour lequel cette demande est faite, nous estimons :

- Fréquence du soin : au besoin
- Temps total/jour :
- Nombre de soignants nécessaires : 1 personne

Soins de la peau : Temps total/jour :

Suivi journalier des diarrhées et des vomissements

Surveillance de l'état d'hydratation

Entretien de l'équipement et des fournitures médicales : Temps total/jour :

Inventaire de l'équipement et des fournitures médicales et commandes au besoin. Temps total :

Livraison des fournitures

Signature :

Date :



www.soinscomplexesadomicilepourenfants.com
www.complexcareathomeforchildren.com



Ensemble pour soutenir les familles... un jour à la fois!

Together to support families... one day at a time!

NUTRITION PARENTÉRALE : FORMULAIRE COMPLÉMENTAIRE DE DONNÉES CLINIQUES

Nom

Horaire de la planification des soins - à remplir par le professionnel

	Nutrition parentérale	Nutrition entérale	Préparation et administration de médicaments	Soins de stomie digestive	Alimentation orale	Autres
00:00 06:00						
06:00 12:00						
12:00 18:00						
18:00 24:00						